



Photo : Eddy MAYEUR

Généralités

Pays d'origine : Belgique

Ascendance : Lapins Nains Béliers et Nains Satins

Importance : Assez peu répandue

Premier standard adopté le 24 février 2018 à Paris (75) par la Fédération Française de Cuniculiculture.

Dimensions minimales des boxes de concours : 50 x 50 x 50 cm

Echelle des points		
1	Aspect général	20
2	Masse	10
3	Fourrure : brillance et satiné	20
4	Fourrure : homogénéité, densité, longueur	15
5	Tête, yeux, oreilles et coiffure	15
6	Modèle de coloration	15
7	Présentation et soins	5
TOTAL		100

Echelle des poids	
1,200 - 1,500	9 points
1,500 - 2,000	10 points
2,000 - 2,200	9 points

Description

1 - Aspect général

Le type doit présenter toutes les caractéristiques d'un nain bélier. Le corps est court et fortement trapu. La musculature est puissamment développée sur une ossature moyennement fine faisant ressortir une rotundité d'ensemble prononcée. La nuque est forte et courte. L'avant-train, large, comprend une poitrine pleine et de fortes et solides épaules. La ligne dorsale, légèrement courbée, se termine par une croupe pleine et arrondie. Les pattes bien positionnées paraissent courtes et puissantes.

La taille réduite doit toujours faire ressortir l'apparence naine compte-tenu de sa conformation spécifique.

Le fanon est nul chez les deux sexes.

2 - Masse

Poids minimum : 1,200 kg

Poids idéal : 1,500 kg à 2,000 kg

Poids maximum : 2,200 kg.

3 - Fourrure : brillance et satiné

L'éclat et le lustre exceptionnels de la fourrure dus à une structure pileuse particulière (absence de moelle, moins de pigments plus concentrés dans un poil de fin diamètre) ressortent nettement et régulièrement sur tout le corps.

Le brillant satiné qui en résulte est particulièrement exprimé sur les poils de couverture. En soufflant dans la fourrure, on voit que le lustre reste perceptible en profondeur.

NB : La présence du gène récessif satin à l'état homozygote chez un lapin satin entraîne une déstructuration des canaux médullaires du poil qui disparaissent suite à l'inactivation d'une scléroprotéine habituellement chargée de la structuration de la moelle. Le poil présente alors un diamètre plus petit. La présence de pigments en faible quantité (voire leur absence chez l'ivoire) et leur concentration dans la tige pileuse, diminuent ainsi l'absorption de la lumière et renforcent par conséquent sa réflexion. Le lapin paraît ainsi plus brillant et la couleur, quand elle existe, est intensifiée.

4 - Fourrure : homogénéité, densité, longueur

L'homogénéité de la fourrure se manifeste par le développement équilibré des poils de couverture. D'une longueur appropriée à la taille naine, ils sont structurellement très fins, très serrés au corps et ils dépassent le sous-poil très dense.

5 - Tête, yeux, oreilles et coiffure

La tête est forte chez le mâle, avec un nez développé et un front large, des joues et des mâchoires pleines. Elle est un peu plus allongée chez la femelle, sans pour autant être fine. Le chanfrein est busqué (tête de bélier). Les paupières sont bien ouvertes.

Les oreilles débutent par un fort bourrelet basal (couronne). Elles s'infléchissent et tombent en forme de fer à cheval de chaque côté de

la tête, l'intérieur du pavillon tourné vers les joues. Elles mesurent de 22 à 28 cm de bout en bout. Leur largeur est proportionnée à la taille naine du sujet. Elles sont velues, assez consistantes et arrondies à leur extrémité.

6 – Modèle de coloration

Les variétés admises sont celles relevées à la position 6 du Satin « race à fourrure » : Ivoire aux yeux rouges ou bleus, Noir, Bleu foncé, Havane, Rouge, Feh, Lynx, Chinchilla, Castor, Lièvre, Siamois, Chamois et Himalayen (Californien) noir, bleu ou havane. Par rapport à un pelage normal, elles sont appréciées dans des nuances plus intenses. La structure particulière du poil lié à sa brillance exceptionnelle modifie assez distinctement la perception de la tonalité de base.

Chez le satin, la moelle du poil est absente, concentrant ainsi les pigments – quand ils existent - dans la tige pileaire. Dès lors, la capacité de réflexion de la lumière est accrue. Pour les variétés blanches, l'absence de pigment, se traduit par une teinte « ivoire ».

La sous-couleur, l'entre-couleur, la couleur des yeux et celle des ongles suivent la description des divers modèles de coloration décrits par ailleurs.

7 - Présentation et soins

Conformément aux prescriptions générales.

Défauts

Défauts légers

Défauts légers valables pour toutes les races (Voir Règlement Général)

- 1 - Corps insuffisamment trapu. Musculature pas assez développée.
Peau un peu lâche sur le corps.
- 3 - Brillant satiné peu prononcé.
- 4 - Fourrure un peu grossière, un peu laineuse ou un peu molle.
Fourrure un peu courte ou un peu longue.
- 5 - Tête pas assez caractéristique, cou apparent.
Port des oreilles oblique. Couronne un peu plate.
- 6 - Défauts légers spécifiques au modèle de coloration.

Défauts graves

Défauts graves valables pour toutes les races (Voir Règlement Général)

- 1 - Manque total de type. Corps aminci, élancé ou décousu.
Taille excessive. Culotte flottante.
- 3 - Absence de brillant satiné.
- 4 - Fourrure grossière, trop laineuse ou manquant de tenue.
- 5 - Tête trop fine, trop allongée ou insuffisamment busquée.
Mauvais port d'oreilles. Oreilles trop courtes (moins de 22cm) ou trop longues (plus de 28 cm).
- 6—Défauts graves spécifiques au modèle de coloration.